

SOLO CON RECETA

## MEDICAMENTO BUPROPION

También se puede llamar  
**WELLBUTRIN®** o **ZYBAN®** genérico



### PROS / CONTRAS

- ✓ Fácil de usar
  - ✓ Forma de píldoras
  - ✓ Pocos efectos secundarios
- × Puede no ser adecuado para personas con ciertas condiciones médicas, como presión alta o convulsiones.\*

Notas

### CÓMO USAR\*

Comience 1-2 semanas antes de la fecha objetivo para dejar de fumar. Tomará todo este tiempo sentir los efectos del medicamento.

Puede usarse con otros tratamientos (chicle, parche, aerosol nasal, pastillas e inhalador). Usar durante al menos 12 semanas.

8 horas de diferencia



## MEDICAMENTO VARENICLINE

También se puede llamar  
**CHANTIX®** genérico



### PROS / CONTRAS

- ✓ Fácil de usar
  - ✓ Pill form
  - ✓ Reduce significativamente los antojos
- × Puede causar náusea, cambios en el estado de ánimo y sueños extraños.\*

Notas

### CÓMO USAR\*

Comience 1 semana antes de la fecha objetivo para dejar de fumar. Tomará todo este tiempo sentir los efectos del medicamento.

Tomar con comida y agua. Usar durante al menos 12 semanas.



\* Consulte con su médico para determinar las opciones de tratamiento y las dosis adecuadas.

Combine medicamentos con orientación  
para **DUPLICAR** sus oportunidades  
para dejar de fumar.

# MICHIGAN TOBACCO QUITLINK

Orientación y apoyo  
confidencial **GRATUITO**

1.800.784.8669

Llame ahora  
**1.800.QUIT.NOW**

www

O insíbase en línea  
[michigan.quitlogix.org](http://michigan.quitlogix.org)

OBTenga MÁS  
INFORMACIÓN



## OPCIONES DE MEDICAMENTOS GUÍA RÁPIDA



MI TOBACCO  
**Quitlink** HBOM