

仅限处方

药物

安非他酮

也可称为通用类
WELLBUTRIN® or ZYBAN®



优/缺点

- ✓ 易于使用
- ✓ 丸剂形式
- ✓ 副作用较少

✗ 对高血压或癫痫等疾病的患者有可能不利


备注



如何服用*

在目标戒烟日期前1-2周开始。的确需要这么长时间才能感受到药物的效果。

可与其他疗法一起服用（口香糖、贴片、鼻喷雾剂、喉糖和吸入器）。至少服用12周。



仅限处方

药物

伐尼克兰

也可称为通用类
CHANTIX®



优/缺点

- ✓ 易于使用
- ✓ 丸剂形式
- ✓ 显著降低烟瘾

✗ 会导致恶心变化和异常梦境。*

备注



如何服用*

在目标戒烟日期前1周开始。的确需要这么长时间才能感受到药物的效果。

与食物和水一起服用。至少服用12周。



* 请咨询医生, 以找到适合您的治疗方案和剂量。

药物治疗与心理咨询相结合，
戒烟几率 翻倍。

密歇根
烟草

QUITLINK

1.800.784.8669

保密性 获得
免费的保密咨询和支持

立刻致电
1.800.QUIT.NOW

www

或在线报名
michigan.quitlogix.org

了解更多内容



用药安全
快速指南



MI TOBACCO
Quitlink HBOM