

بوصفة طبية فقط



الدواء

فارينيكلين

قد يطلق عليه أيضًا الدواء الجنييس لـ

CHANTIX®

كيفية الاستخدام*

ابدأ في تناوله قبل أسبوع واحد من تاريخ الإقلاع المستهدف. سيستغرق الأمر هذه المدة حتى تشعر بآثار الدواء.

تناوله مع الطعام والماء. استخدمه لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.



ملاحظات

بوصفة طبية فقط

الدواء

بوبروبيون

قد يطلق عليه أيضًا الدواء الجنييس لـ

ZYBAN® أو **WELLBUTRIN®**



كيفية الاستخدام*

ابدأ في تناوله قبل أسبوع أو اثنين من تاريخ الإقلاع المستهدف. سيستغرق الأمر هذه المدة حتى تشعر بآثار الدواء.

يمكن استخدامه مع علاجات أخرى (العلكة واللاصقة وبخاخ الأنف) وقرص الاستحلاب وجهاز الاستنشاق). استخدمه لمدة 12 أسبوعًا على الأقل.

بفارق 8 ساعات



ملاحظات

دليل سريع
لخيارات الأدوية



MI TOBACCO
Quitlink HBOM

استعن بكل من الأدوية والخدمات الاستشارية
لمساعدة فرصك في الإقلاع عن التدخين.

خدمات استشارة ودعم سرية
ومجانية

بولاية ميشيغان
عن تدخين التبغ

رابط المساعدة على الإقلاع

1.800.784.8669



اتصل الآن على الرقم

QUIT.NOW.1.800

تعرف على المزيد



www

أو التحقق إلكترونيًا عبر

michigan.quitlogix.org